

INWAZYJNY GATUNEK OBCY:

# tojeść kropkowana

(*Lysimachia punctata*)

Pochodzenie: Europa Południowo-Wschodnia

Kategoria inwazyjności: I

foto: istockphoto.com/Dalmech

Bylina o ozdobnych żółtych kwiatostanach. Rozmnaża się za pomocą podziemnych pędów (kłączy) oraz nasion. Preferuje gleby świeże lub wilgotne. Może tworzyć zwarte kępy, które zmieniają strukturę i skład gatunkowy rodzimej roślinności.

## Zastosowanie

Roślina ozdobna występująca w ogrodach przydomowych i zieleni publicznej.

## Inwazyjność w Polsce

Gatunek inwazyjny tylko w skali lokalnej, ale stopniowo zajmuje nowe stanowiska. Roślina występuje na wilgotnych łąkach, torfowiskach, w nadrzecznych zbiorowiskach bylin (ziołoroślach), zaroślach oraz lasach łęgowych. W Polsce występuje mała liczba stanowisk rośliny. Spotykana głównie w Sudetach, na Górnym Śląsku i Podhalu.

## Zalecenia

Rezygnacja z uprawy lub minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się rośliny poza miejsce uprawy poprzez:

- regularne wykopywanie młodych roślin z obszarów sąsiadujących z miejscem uprawy (ponieważ może odrastać z fragmentów kłączy),
- ścinanie kwiatostanów po przekwitnięciu i ich utylizację,
- usunięcie rośliny po zakończeniu uprawy.

## Obszary, na których nie należy stosować gatunku

- w pobliżu lasów, torfowisk i cieków wodnych,
- w otwartym krajobrazie,
- na obszarach chronionych i w ich otulinie.

# inwazyjne gatunki obce w środowisku przyrodniczym mogą wyrządzić wiele szkód