

INWAZYJNY GATUNEK OBCY:

winobluszcz zaroślowy

(*Parthenocissus inserta*)

Pochodzenie: Ameryka Północna

Kategoria inwazyjności: II

foto: Stem [GFDL (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>)], Wikimedia Commons

Drewniejące pnącze o niebieskich owocach, tworzące wąsy czepne (pozbawione przyłg). Jesienią liście przebarwiają się na czerwono. Rozmnaża się za pomocą ukorzeniających się pędów i przez nasiona. Jego owoce są zjadane przez ptaki, a nasiona rozsiewane na znaczne odległości. Gatunek dobrze znosi mróz, ocienienie, suszę oraz zanieczyszczenia powietrza. Ma niewielkie wymagania glebowe, w związku z tym łatwo zajmuje nowe tereny, gdzie tworzy zwarte tany lub porasta drzewa i krzewy.

Zastosowanie

Ozdobna roślina okrywowa sadzona w miastach i rejonach przemysłowych.

Inwazyjność w Polsce

Gatunek inwazyjny w skali regionalnej, stopniowo zajmuje nowe stanowiska. Często dziczeje, rozprzestrzenia się na terenach przekształconych, jak również w lasach i zaroślach, na brzegach rzek i jezior. W Polsce występuje duża liczba stanowisk, głównie na zachodzie i południu kraju. Roślina rośnie m.in. w Ojcowskim Parku Narodowym.

Zalecenia

Rezygnacja z uprawy lub minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się rośliny poza miejsce uprawy poprzez:

- regularne koszenie lub wykopywanie młodych roślin z obszarów sąsiadujących z miejscem uprawy,
- usunięcie rośliny po zakończeniu uprawy.

Obszary, na których nie należy stosować gatunku

- w pobliżu lasów, cieków i zbiorników wodnych,
- w otwartym krajobrazie,
- na obszarach chronionych i w ich otulinie.

**inwazyjne gatunki obce
w środowisku przyrodniczym
mogą wyrządzić wiele szkód**