

Branta canadensis

- 1) nazwa polska:
- 2) nazwa łacińska:
- 3) nazwa angielska:

Bernikla kanadyjska
Branta canadensis L. 1758
Canada goose



fot.: Marek Szczepanek

Informacje o gatunku

Naturalny rejon występowania bernikli kanadyjskiej rozciąga się od zachodniej Grenlandii, przez Amerykę Północną, aż do Wypsk Karaibskich. Jest gatunkiem występującym w środowisku przyrodniczym Polski, rozmnażającym się, silnie ekspansywnym. Drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania tego gatunku, związane z udziałem człowieka, to celowa introdukcja i ucieczki z hodowli. Bernikla kanadyjska ponadto rozprzestrzeniła się spontanicznie. Gatunek ten zasiedla obszary przybrzeżne, tereny podmokłe, zbiorniki i ciek wodne, obszary rolnicze i miejskie, np. parki. Bernikla kanadyjska wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze, uprawy roślin, hodowle zwierząt, ludzi i inne obiekty. Wpływ na środowisko przyrodnicze przejawia się przede wszystkim poprzez hybridyzację z innymi gatunkami ptaków oraz poprzez przenoszenie bardzo wielu groźnych patogenów, a także poprzez zanieczyszczenie odchodami zbiorników wodnych, co prowadzi do ich eutrofizacji. Wpływ na hodowle zwierząt i ludzi związany jest również głównie z przenoszeniem przez ten gatunek licznych patogenów. Wpływ na uprawy roślin ma związek z żerowaniem bernikli w uprawach zbóż oraz deptaniem i zanieczyszczeniem upraw odchodami. Zanieczyszczenie odchodami zbiorników wodnych, plaż, parków, pól golfowych, oraz zagrożenie dla lotnictwa powodowane przez kolizje ptaków z samolotami, stanowią z kolei niekorzystny wpływ tego gatunku na inne obiekty.

Mapy występowania gatunku:

- [mapa występowania gatunku w środowisku przyrodniczym w Polsce w Geoserwisie GDOŚ](#)
- [mapa zasięgu gatunku w Polsce \(JPG\)](#)
- [mapa występowania gatunku w krajach Europy \(JPG\)](#)

Dodatkowe informacje:

[Karta Informacyjna Gatunku \(PDF\)](#)

[Analiza Stopnia Inwazyjności Gatunku \(PDF\)](#)

[Wróć do listy inwazyjnych gatunków obcych zwierząt](#)