

Callosciurus erythraeus

- 1) nazwa polska:
- 2) nazwa łacińska:
- 3) nazwa angielska:

Wiewiórczak rdzawobrzuchy
Callosciurus erythraeus Pallas, 1779
Pallas's squirrel



foto.: Laura Guichon

Informacje o gatunku

Regionem pochodzenia wiewiórczaka rdzawobrzuchego jest Azja Południowa. Wszystkie przypadki wsiedlenia gatunku do środowiska przyrodniczego Europy były wynikiem zamierzonych działań lub ucieczek z hodowli. Gatunek jest plastyczny i z łatwością osiedla się w antropogenicznych środowiskach, np. w miastach. Lokalne populacje są w stanie stopniowo powiększać zasięg, gdyż osobniki tego gatunku mogą rozprzestrzeniać się, wykorzystując niewielkie zadrzewienia, a nawet pojedyncze drzewa i przewody jako korytarze dyspersji. Wiewiórczak rdzawobrzuchy nie został do tej pory stwierdzony w środowisku przyrodniczym Polski, ale był i prawdopodobnie nadal jest hodowany. W przypadku przedostania się gatunku do naszego kraju, możliwy jest jego negatywny wpływ na rodzimą wiewiórkę pospolitą, z uwagi na konkurencję międzygatunkową oraz przenoszenie patogenów i pasożytów. Gatunek ten może być również niebezpieczny dla zbiorowisk leśnych głównie ze względu na uszkadzanie kory drzew.

Mapy występowania gatunku:

- [mapa występowania gatunku w krajach Europy \(JPG\)](#)

Dodatkowe informacje:

[Karta Informacyjna Gatunku \(PDF\)](#)

[Analiza Stopnia Inwazyjności Gatunku \(PDF\)](#)

[Wróć do listy inwazyjnych gatunków obcych zwierząt](#)



Unia Europejska
Fundusz Spójności

